

# NESTLING ODER ÄSTLING – WANN BRAUCHT EIN VOGEL HILFE – SICHERE RÜCKFÜHRUNG

## RÜCKFÜHRUNG SINGVÖGEL



Zur Sicherstellung einer Rückführung konzentriert man sich nur auf Arten mit einer Ästlingsphase. Eine Rückführung sollte aber bei bestehenden Unsicherheiten unterbleiben und Experten hinzuziehen.

**Vögel mit Ästlingsphase:** Amsel, Drossel, Fink, Star, Spatz, Rotkehlchen, Meise, Rotschwanz, Kleiber, Grasmücke, Kernbeißer, Stieglitz, Zaunkönig, Zilpzalp, Schnäpper, Bachstelze, Gimpel **und Unterarten**

**Unterscheidung Nestling und Ästling (Ästling ist schon gut befiedert und steht auf seine Füße)**



Spatz nacktes Küken

Nestling

Nestling

bettelnder Ästling



Stare Nestlinge

Nestling

Stare bettelnde Ästlinge

**NESTLING** – bitte setze mich zurück ins Nest  
Wenn kein Nest dann halte mich bitte warm  
Aber gib mir **KEIN** Wasser oder Futter!

**ÄSTLING** – bitte lasse mich bei meiner Familie, ich lerne gerade fliegen. Sitze ich an einer gefährlichen Stelle dann setze mich bitte erhöht in ein Gebüsch oder Ast

### **Ausnahmen wo Keine Rückführung von Ästlingen stattfinden sollte wären:**

- nach Katzenkontakt oder Hundekontakt
- aufgeplusterte Vögel
- nach falscher Fütterung oder Wassereingabe
- bei grünem oder nur weißem Kot (ausschließlich Harnanteil)
- bei Verletzungen
- bei Befall von Parasiten
- bei Nichtauffinden der Elterntiere

Ist ein Zurücksetzen auf einem Ast / Busch in Elternnähe nicht möglich oder die Umgebung zu gefährlich für den Ästling sollte man **zeitnah am Tage (Tageslicht) in Sichtweite aber mit großem Abstand dass die Eltern nicht scheuen ihn sicher unterbringen** in Sichtweite der Elterntiere damit sie ihren Nachwuchs hören und sehen können und füttern wie zum Beispiel **Oberteil von einem Kleintierkäfig oder Vogelkäfig, umgedrehter Fahrradkorb, Umgedrehter Wäschekorb, eine Transportbox mit Gitter oben oder ein Karton mit einem Grillrost oder Ofen Rost oben drauf**. Wenn die Elterntiere dem Ästling antworten, zum Füttern herunterkommen kann man die sichere Unterbringung öffnen damit der Kleine zu den Eltern zurück kann. Auch hier wieder zügig großen Abstand halten damit alles klappt. Sollte es nicht klappen muss der Ästling zu einem Experten gebracht werden oder ein Experte hinzugezogen werden.

## RÜCKFÜHRUNG TAUBEN, MAUERSEGLER/SCHWALBEN UND RABENVÖGEL WIE KRÄHEN

### AUSSNAHMEN SIND TAUBEN,

Taubenküken verlassen erst das Nest, wenn sie flügge sind. Ein Taubenküken am Boden bedeutet, dass etwas nicht stimmt. Solche Nestlinge werden am Boden nicht weiter gefüttert wie z.B. bei Krähen, Singvögel usw. Jungtauben die auf dem Boden sitzen sind immer in Not und müssen ins Nest zurückgesetzt werden.



Ausser bei **RINGELTAUBEN**  
Wenn junge Ringeltauben schon alleine laufen können  
(nicht nur sitzen)  
werden sie von den Eltern weiterbetreut.



sitzende Taubenküken müssen ins Nest zurück



Wenn kein Nest zu finden: SICHERN

### MAUERSEGLER UND SCHWALBEN...

Mauersegler am Boden benötigen immer Hilfe.  
Jungtiere werden **nicht** am Boden weiter versorgt.  
**Bitte sichern! KEIN** Wasser und **KEIN** Futter geben.



## RABENVÖGEL (KRÄHEN, RABEN, DOHLEN, EICHELHÄHER)

Bei Rabenvögel unterscheidet sich die Rückführung gegenüber kleinerer Singvögel dass die Zeit und Dauer der Rückführung viel später geschehen kann. Also auch nachdem ein Ästling einfach mitgenommen wurde kann er nach er Weile wieder zu den Elterntieren zurückgeführt werden.

Das sollte aber definitiv nur passieren wenn die Vögel KEIN Wasser eingeflößt bekommen haben oder falsches Futter bekommen haben. Er sollte aktiv sein und nicht krank oder schwach wirken.

Auch hier wieder das gleiche Verfahren wie bei Singvögel, nur braucht man hier mehr Geduld und Zeit da Rabenvögel Eltern nicht den ganzen Tag am Brutplatz aufzufinden sind. Sprich, es sollte an mehreren Tagen und zu verschiedenen Tageszeiten passieren.

### Beispiel Rückführung eines Nebelkrähen Ästling




Abstand halten, Geduld



Elterntier kommt gucken



Ästling klettert hoch



Wieder zurück zur Familie

Beispiel Rückführung eines Krähenästling in Berlin. Unsere Mirka hat die Rückführung übernommen. Es dauerte 1 Woche und sie hat täglich mit dem Ästling die Eltern besucht, damit sie sehen, ihr Kind lebt, Hühnerherzen in die Nähe der suspekten Box gelegt (unter Beobachtung der Erwachsenen Krähen) damit sie näher und somit in Sichtkontakt mit dem kleinen kommen. **Erstes Gebot ist Geduld und Ruhe.**

Auch wenn wir Menschen die Altvögel nicht sehen, hören oder glauben, sie seien nicht da - sie sind da, beobachten alles ganz genau. Immer wenn Mirka die Box nahm und nach Hause ging schimpften sie.


### Unterscheidung Nestling und Ästling (Ästling ist schon gut befiedert und steht auf seine Füße)



Nebelkrähe Nestling



Nebelkrähe Nestling, schon fast Ästling



Ästling (steht auf Füße)

# Wann braucht ein Rabenvogel Junges Hilfe?

## Nackter Nestling



## Befiederter Nestling



### BRAUCHT HILFE

Da die Nester von Rabenvögel sehr hoch in den Baumkronen liegen, wird es schwierig sein, die kleinen ins Nest zurück zu tun. Meistens werden absichtlich Küken aus dem Nest geworfen (natürliche Auslese), da sie Krank oder Parasiten haben, damit die nächste Generation gesichert ist.

## Ästlinge

Steht auf den Füßen und kann noch nicht Fliegen. Sie lernen das Fliegen außerhalb des Nestes auf dem Boden



Hilfe	Keine Hilfe
<b>Verletzt</b>	Eltern vorort, wird versorgt, Eltern kommunizieren mit ihr junges
Keine Eltern, wird nicht mehr versorgt. (Über mehrere Stunden Beobachten, aus großer Distanz, Rabenvögel können sehr gut sehen.)	Sitzt das junges in einer Gefahrenstelle (zb. Straße etc.) bitte umsetzen (zb. Auf einen Ast/Busch) aus der Gefahr. Eltern akzeptieren das junges trotzdem, weiter Beobachten.