

Igel richtig entflohen

Achtung, diese Behandlungsmethoden sind nur für Igel in Kurzzeitpflege gedacht zum Päppeln oder Genesen. Igel werden ausnahmslos nur **in stabilem Zustand** entfloht und freilebende Igel werden grundsätzlich **nicht** entfloht! Warum, lest ihr in der PDF.

Igel werden niemals mit Spot Ons oder Frontline (Fipronil Wirkstoffe) sowie Flohpuder oder Flohbäder entfloht!

Igel unter 300 Gramm werden grundsätzlich mit keinen Flohmitteln entfloht!

Man kann Igelkinder **mit pflanzlichem Öl** (z.B. Sonnenblumenöl, Kokos oder Rapsöl) vorsichtig einpinseln oder in eine Sprühflasche gefüllt einsprühen. Nach einer Weile sterben die Flöhe.

Die Flöhe mit **einer Zahnbürste** oder weichen Katzenbürste **abbürsten**.

Dazu den Igel über eine mit Wasser & Spülmittel gefüllte Schüssel halten damit die Flöhe hineinfallen.

Igel ab 100 Gramm können oral entfloht werden mit **capstar** (die Tablette achteln und gemörsert ins Futter geben) Nach einer halben Stunde sollte es wirken.

Igel ab 300 Gramm ¼ Tablette

Igel ab 500 Gramm ½ Tablette

Igel ab 300 Gramm werden in Igelstationen mit **Permethrin** Biomo Lösung 0,5% oder **Johnson Insecticidal** Spray Extra Small Animal entfloht.

Es gibt auch aus dem Zoohandel Präparate mit dem Wirkstoff Propoxur, dazu zählen Bolfo und Beaphar Flohschutzspray)

Eingesprüht wird der Igel mit zwei kurzen Sprühstößen auf den Hinterkörper und **abgedeckten Kopf**.

Bei kleinen Igeln kann man das Präparat auch auf ein Handtuch sprühen und den Körper damit kurz einwickeln statt aufsprühen.

